


ベストマッチ® 22-6-6-Mg1

アスパラ・ネギ用266

20kg/袋

化成肥料と3種類の被覆肥料の配合で、アスパラガスや白ネギの生育に好適な肥効が秋までじつくりと持続します。また、アスパラガス収穫後の株養成用としてもお使いいただけます。



N	窒素（化成）	0.8 kg
	窒素（被覆）	3.6 kg
P	りん酸（化成）	1.2 kg
K	加里（化成）	1.2 kg
Mg	苦土（化成）	0.2 kg

特長

アスパラ栽培に、好適な肥効が望めます


アスパラは、芽出しの時期から十分に肥料を効かせ、地上部の生育とともに地下部を太らせることがポイントです。また、収穫後の施肥により、翌年への養分蓄積のために茎葉伸長を促します。

春の白ネギ栽培に、好適な肥効が望めます

白ネギは、4～6月の定植時期から十分に肥料を効かせ、生育中期～後期まで安定した肥効を持続することがポイントです。

(1袋20kgあたり)

ベストマッチ アスパラ・ネギ用266の肥効イメージ



作物	施用量(10a当り)		施用方法
	現物量	窒素量	
アスパラ 春施肥	200～240kg	44.0～52.8kg	施用量は左記を参考に、慣行の総窒素量と合わせて地力により増減してください。元肥として全量を全面混層施用してください。堆肥、石灰、りん酸資材などの土壌改良資材は従来通り施用してください。
アスパラ 収穫後施肥	80～100kg	17.6～22.0kg	
白ネギ	100～120kg	22.0～26.4kg	